

SINDROME BRACHICEFALICA

La sindrome brachicefalica può essere definita come un'ostruzione delle prime vie respiratorie risultante dalla conformazione anatomica dei cani brachicefali.

Le razze maggiormente colpite sono:

- Bulldog inglese;
- Boston terrier;
- Carlino;
- Pechinese;
- Lhasa Apso;
- Boxer;
- Shih Tzu;
- Shar Pei.

La sindrome è composta dai seguenti difetti:

- stenosi delle narici;
- palato molle (velo palatino) lungo;
- eversione dei sacculi laringei;

a cui possono associarsi ipoplasia tracheale e collasso laringeo (nelle fasi più avanzate).

SERVIZI

- ESAME CLINICO
- ESAME LARINGOSCOPICO IN SEDAZIONE
- RESEZIONE NARICI STENOTICHE
- RESEZIONE SACCULI LARINGEI
- RESEZIONE PALATO MOLLE ALLUNGATO



OSPEDALE VETERINARIO CROCE AZZURRA
De.LeR.VeT. S.r.l. - Dir. San. Dott. D. De Leonardis
P.le Cina n° 68 / 72 - 00144 - Roma
Tel. 0652200364 - Fax 065203724
Web: <http://www.ospedalecroceazzurra.it>
E-mail: info@ospedalecroceazzurra.it
P. IVA n° 08943011000



OSPEDALE VETERINARIO
CROCE AZZURRA
PRONTO SOCCORSO 24h

Terapia Intensiva - Oncologia - Cardiologia
Pronto Soccorso - Laboratorio di Analisi
Chirurgia - Medicina Comportamentale
Medicina Interna - Dermatologia - Oftalmologia
Ortopedia - Ecografia - Radiologia Digitale
Malattie Infettive - Chirurgia Mini Invasiva

Sindrome Brachicefalica



Patologie Respiratorie

Dott. T. Di Francesco (chirurgia)
E-mail: t.difrancesco@ospedalecroceazzurra.it
Telefono: 0652200364

PATOGENESI

Per cause genetiche, i soggetti brachicefali presentano un accrescimento delle ossa maggiore in larghezza rispetto alla lunghezza e un accrescimento normale dei tessuti molli che risulteranno pertanto sproporzionati.

Tipicamente presentano muso compresso, scarso sviluppo delle narici e naso-faringe distorto.



OSPEDALE VETERINARIO
CROCE AZZURRA
PRONTO SOCCORSO 24h

Terapia Intensiva - Oncologia - Cardiologia
Pronto Soccorso - Laboratorio di Analisi
Chirurgia - Medicina Comportamentale
Medicina Interna - Dermatologia - Oftalmologia
Ortopedia - Ecografia - Radiologia Digitale
Malattie Infettive - Chirurgia Mini Invasiva

DIAGNOSI

La diagnosi di stenosi delle narici si basa sull'esame clinico del soggetto in cui si evidenziano narici deviate medialmente che durante la fase inspiratoria deviano ulteriormente in senso mediale anziché abdersi.

Per diagnosticare il palato molle allungato e l'eversione dei sacculi laringei è necessario sottoporre il paziente ad una sedazione per eseguire l'esame laringoscopico.

Dott. T. Di Francesco (chirurgia)

E-mail: t.difrancesco@ospedalecroceazzurra.it

Telefono: 0652200364

TERAPIA

Terapia medica.

Nei casi più lievi è possibile migliorare le condizioni dei pazienti mediante:

- riduzione del peso corporeo;
- riduzione dell'esercizio fisico;
- eliminazione di tutte le possibili cause scatenanti (stress, eccitazione, caldo eccessivo, umidità).

Terapia chirurgica.

Spesso la terapia chirurgica è l'unica soluzione per poter alleviare la sintomatologia.

La chirurgia prevede la resezione delle narici stenotiche, la resezione del palato molle lungo, la resezione dei sacculi laringei.

Questi pazienti presentano gravi rischi anestesiológicos e postoperatori, pertanto andranno attentamente monitorati nella fase postchirurgica.